



información para el paciente



ISENTRESS[®]
raltegravir tabletas

Lea la información para el paciente que viene con ISENTRESS antes de comenzar a tomarlo y cada vez que renueve su receta. Podría haber nueva información. Este folleto es un resumen de la información para pacientes. Su médico o su farmacéutico le pueden proporcionar información adicional. Este folleto no reemplaza las conversaciones con su médico acerca de su afección o tratamiento.

¿Qué es ISENTRESS?

- ◆ ISENTRESS es un medicamento contra el VIH (antirretroviral), que se usa para tratar el VIH. El término “VIH” es la sigla de virus de la inmunodeficiencia humana. Es el virus que causa el SIDA (o síndrome de inmunodeficiencia adquirida). ISENTRESS se usa en conjunto con otros medicamentos contra el VIH. ISENTRESS NO cura la infección por VIH.
- ◆ Las personas que toman ISENTRESS pueden contraer infecciones, incluidas las infecciones oportunistas u otras afecciones que se producen al tener una infección por VIH.
- ◆ Usted debe estar controlado por su médico durante el tratamiento con ISENTRESS.
- ◆ No se ha estudiado la seguridad y la eficacia de ISENTRESS en niños.

ISENTRESS debe usarse con otros medicamentos contra el VIH.



¿Cómo actúa ISENTRESS?

- ◆ ISENTRESS bloquea una enzima que el virus (VIH) necesita para producir más virus. La enzima que ISENTRESS bloquea se llama integrasa del VIH.
- ◆ Cuando se usa con otros medicamentos contra el VIH, ISENTRESS puede hacer dos cosas:
 1. Puede reducir la cantidad de VIH en la sangre. Esto se llama “viremia”.
 2. Puede aumentar la cantidad de glóbulos blancos, llamados linfocitos (T) CD4.
- ◆ Puede que ISENTRESS no tenga estos efectos en todos los pacientes.

¿Reduce ISENTRESS la posibilidad de contagiar el VIH a otras personas?

No. ISENTRESS no reduce la posibilidad de contagiar el VIH a otras personas por contacto sexual, por compartir agujas o por estar expuesto al contacto con sangre.

- ◆ Continúe adoptando prácticas de sexo seguras.
- ◆ Use condones de látex o poliuretano u otros métodos de barrera para reducir las probabilidades de contacto sexual con cualquier líquido corporal. Entre éstos figuran el semen, las secreciones vaginales o la sangre.
- ◆ Nunca reutilice ni comparta agujas.

Si tiene dudas sobre las prácticas de sexo seguras o sobre cómo evitar contagiar el VIH a otras personas, hable con su médico.

¿Qué le debo decir a mi médico antes y durante el tratamiento con ISENTRESS?

Informe a su médico de todas sus afecciones médicas. Dígale también si usted está en alguna de las situaciones siguientes:

- ◆ Tiene alguna alergia.
- ◆ Está embarazada o planea quedar embarazada.
 - No se recomienda el uso de ISENTRESS durante el embarazo. No se ha estudiado el uso de ISENTRESS en embarazadas. Si toma ISENTRESS mientras está embarazada, hable con su médico acerca de cómo se la puede incluir en el registro de embarazos para antirretrovirales.
- ◆ Está amamantando o planea amamantar.
 - Se recomienda que las mujeres infectadas por VIH no amamenten a sus bebés. Esto se debe a que los bebés podrían infectarse con el VIH por medio de la leche materna.
 - Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé.



Informe a su médico de todos los medicamentos que tome. Incluya los siguientes:

- ◆ medicamentos de venta con receta, entre ellos la rifampina (medicamento que se usa para tratar algunas infecciones, como la tuberculosis)
- ◆ medicamentos de venta sin receta
- ◆ vitaminas
- ◆ suplementos herbarios

Sepa los medicamentos que toma.

- ◆ Mantenga una lista de sus medicamentos. Muéstreles la lista a su médico y a su farmacéutico cuando le den un nuevo medicamento.

¿Cómo debo tomar ISENTRESS?

Tome ISENTRESS exactamente como se lo recetó su médico. A continuación se indica la dosis recomendada:

- ◆ Tome solamente una tableta de 400 mg cada vez.
- ◆ Tómela dos veces por día.
- ◆ Tómela por la boca.
- ◆ Tómela con o sin alimentos.

No modifique su dosis ni deje de tomar ISENTRESS ni ninguno de sus medicamentos contra el VIH sin hablar primero con su médico.

IMPORTANTE: Tome ISENTRESS exactamente como se le recetó y en los horarios correctos del día, porque si no lo hace:

- ◆ Podría aumentar la cantidad de virus (VIH) en su sangre si el medicamento se suspende, incluso durante un período corto.
- ◆ El virus podría desarrollar resistencia a ISENTRESS y volverse más difícil de tratar.
- ◆ Sus medicamentos podrían dejar de actuar para combatir el VIH.
- ◆ La actividad de ISENTRESS podría disminuir (debido a la resistencia).

Si deja de tomar ISENTRESS como le indicaron, debe hacer lo siguiente:

- ◆ Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. Si no se acuerda hasta la hora en que debe tomar su dosis siguiente, sátese la dosis olvidada y vuelva al esquema de tratamiento normal. NO tome dos tabletas de ISENTRESS al mismo tiempo. Dicho de otro modo, NO tome una dosis doble.
- ◆ Si toma demasiado ISENTRESS, llame a su médico o al centro de toxicología de su localidad.



Asegúrese de mantener una reserva de medicamentos contra el VIH.

- ◆ Cuando su reserva de ISENTRESS se esté por agotar, acuda a su médico o a su farmacia para obtener más.
- ◆ No espere hasta que el medicamento se acabe por completo para conseguir más.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ISENTRESS?

Cuando ISENTRESS se ha administrado con otros fármacos contra el VIH, los efectos secundarios más comunes han sido los siguientes:

- ◆ náuseas
- ◆ cansancio
- ◆ problemas para dormir
- ◆ dolor de cabeza
- ◆ debilidad

Otros efectos secundarios incluyen sarpullido, reacciones cutáneas graves, sensación de ansiedad, depresión, pensamientos y acciones suicidas, paranoia, recuento de plaquetas bajo.

Algunos pacientes que tienen infección por VIH en fase avanzada (SIDA) pueden sufrir una afección llamada síndrome de reconstitución inmunitaria al comenzar a recibir el tratamiento antirretroviral combinado. A medida que los medicamentos actúan para controlar la infección por VIH y fortalecer el sistema inmunitario, podrían producirse signos y síntomas de inflamación por infecciones oportunistas que la persona tenga o haya tenido. Llame a su médico de inmediato si observa algún signo o síntoma de infección después de comenzar a tomar ISENTRESS con otros medicamentos contra el VIH.

Comuníquese de inmediato con su médico si sufre dolor muscular, dolor a la palpación o debilidad que no tengan explicación mientras toma ISENTRESS. Esto se debe a que, en raras ocasiones, los problemas musculares pueden ser graves y derivar en daño a los riñones.

Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste.

Éstos no son todos los efectos secundarios de ISENTRESS. Para obtener más información, consulte con su médico o farmacéutico.

¿Cómo debo almacenar ISENTRESS?

- ◆ Almacene ISENTRESS a temperatura ambiente [de 20 a 25 °C (de 68 a 77 °F)].
- ◆ Conserve ISENTRESS y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso de ISENTRESS

Algunas veces los medicamentos se recetan para afecciones que no se mencionan en los folletos de información para el paciente.

- ◆ No use ISENTRESS para una afección para la que no fue recetado.
- ◆ No les dé ISENTRESS a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Podría causarles daño.



Este folleto le brinda la información más importante sobre ISENTRESS.

- ◆ Si desea saber más, hable con su médico.
- ◆ Puede pedirle a su médico o farmacéutico más información sobre ISENTRESS dirigida a los profesionales de la salud.
- ◆ Para obtener más información, visite www.ISENTRESS.com o llame al 1-800-622-4477.

¿Cuáles son los ingredientes de ISENTRESS?

Principio activo: Cada tableta recubierta contiene 400 mg de raltegravir.

Excipientes: Celulosa microcristalina, monohidrato de lactosa, fosfato de calcio dibásico anhidro, hipromelosa 2208, poloxámero 407 (contiene 0.01% de hidroxitolueno butilado como antioxidante), fumarato estearílico de sodio, estearato de magnesio. Además, el recubrimiento contiene los siguientes excipientes: alcohol polivinílico, dióxido de titanio, polietilenglicol 3350, talco, óxido de hierro rojo y óxido de hierro negro.

Distribuido por:

Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de **Merck & Co., Inc.**
Whitehouse Station, NJ 08889, EE.UU.

Modificado en enero de 2010

9795109

Núm. de patente en EE.UU.: US 7,169,780

Lea la información para el paciente que se adjunta y converse sobre ésta con su médico.



ISENTRESS[®]
raltegravir tabletas



ISENTRESS[®]

raltegravir tabletas

Si le recetaron **ISENTRESS** y necesita ayuda para pagar esta medicación, comuníquese con el programa para pacientes **SUPPORT[™]** llamando al 1-800-850-3430, de lunes a viernes, de 9 A.M. a 6 P.M. (hora del este) o diríjase al sitio web **www.isentress.com**.

ISENTRESS es una marca registrada de Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de **Merck & Co., Inc.**, y SUPPORT es una marca comercial de la misma empresa.



www.isentress.com
Copyright © 2010 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de **Merck & Co., Inc.** Todos los derechos reservados.
21050953(2)-06/10-15N Impreso en EE.UU.
Contiene al menos 10% de papel reciclado ♻️

